



# Gemüse- und Zierpflanzenbau



# PRESTOP®

Fungizid für den wirksamen Schutz vor pilzlichen Erregern von Keimlings- und Wurzelkrankheiten sowie *Botrytis cinerea* und *Didymella*

- ✓ Rückstandsfrei
- ✓ Geringes Resistenzrisiko
- ✓ Breites Wirkungsspektrum
- ✓ Im ökologischen Anbau einsetzbar



**BIOFA**   
Bio-Farming-Systems

## Wirkungsweise

PRESTOP® enthält den natürlich vorkommenden Bodenpilz *Gliocladium catenulatum*.

*Gliocladium catenulatum* besiedelt die Oberfläche der Wurzeln sowie oberirdischer Pflanzenteile und schützt sie vor Schadpilzen:

- Verdrängung durch Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum
- Bekämpfung durch Parasitierung



Parasitierung: Hyphen von *Gliocladium* umschlingen eine Hyphe von *Rhizoctonia solani*

## Anwendungsbereiche im Gewächshaus

- Pythium-, Rhizoctonia-, Phytophthora- und Fusarium-Arten als Erreger von Keimlings- und Wurzelkrankheiten im Zierpflanzen- und Gemüsebau
- *Botrytis cinerea* an Fruchtgemüse und Zierpflanzen
- *Didymella* an Fruchtgemüse

## Formulierung und Wirkstoffgehalt

PRESTOP® enthält Sporen und Myzel des Pilzes *Gliocladium catenulatum* J1446. Formulierung als wasserdispergierbares Pulver (WP). Wirkstoffgehalt: 320 g / kg

## Mischbarkeit

PRESTOP® sollte idealerweise solo angewendet werden. Flüssigdünger, die meisten Insektizide und viele Fungizide können direkt vor der Anwendung von PRESTOP® eingesetzt werden. Für einige Pflanzenschutzmittel und Mikroorganismen-Präparate wird empfohlen, eine Wartefrist zwischen den Behandlungen einzuhalten.

Eine Mischbarkeitstabelle finden Sie unter der Produktinformation auf [www.biofa-profi.de](http://www.biofa-profi.de).

## Nützlingsverträglichkeit

PRESTOP® hat keine schädigende Nebenwirkung auf Nützlinge und kann sehr gut in den Nützlingseinsatz integriert werden.

## Lagerung

Im geschlossenen Gebinde trocken und kühl bei max. 4 °C mind. 12 Monate haltbar. Nach Anbruch sollte möglichst der gesamte Packungsinhalt unmittelbar aufgebraucht werden.

## Gebindegröße

1 kg Beutel



## Anwendung

PRESTOP® ist für den vorbeugenden Einsatz vorgesehen. Für einen langfristigen Schutz muss die Behandlung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

- **Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora und Fusarium**  
Gegen bodenbürtige Schadpilze wird PRESTOP® entweder direkt in das Substrat eingemischt oder im Gieß- bzw. Spritzverfahren auf den Boden appliziert. Nach dem Pflanzen oder Topfen ist außerdem eine Ausbringung über Tropfbewässerung möglich. Die Anwendung ist je nach Befallsdruck und Kulturdauer im Abstand von 4–6 Wochen mehrmals zu wiederholen.
- ***Botrytis cinerea*, *Didymella lycopersici***  
Gegen Erkrankungen im Blatt- oder Stängelbereich muss PRESTOP® auf die entsprechenden Pflanzenteile gespritzt werden. Die Anwendung ist je nach Befallsdruck und Kulturdauer im Abstand von 3–4 Wochen mehrmals zu wiederholen.

### Hinweis:

Verholzte, unbewurzelte Stecklinge sollten nicht durch Eintauchen in die PRESTOP®-Suspension behandelt werden. Die Anwendung durch Substratbehandlung, Gießen oder Spritzen ist möglich.

Kulturen (Gewächshaus)	Schaderreger	Aufwandmengen
<b>Substratbehandlung</b>		
Jungpflanzen (Gemüskulturen und Zierpflanzen)	Pythium-, Rhizoctonia-, Fusarium-Arten	200-500 g / m <sup>3</sup> als Substratbehandlung
<b>nach dem Auflaufen</b>		
Fruchtgemüse	Pythium-, Rhizoctonia-, Fusarium-Arten	5-10 g / m <sup>2</sup> gießen
Fruchtgemüse	<i>Botrytis cinerea</i>	1 g / m <sup>2</sup> spritzen
Blatt- und Kohlgemüse, frische Kräuter	Pythium-, Rhizoctonia-, Fusarium-Arten	5-10 g / m <sup>2</sup> gießen
Zierpflanzen	<i>Botrytis cinerea</i>	1 g / m <sup>2</sup> spritzen
<b>nach dem Pflanzen oder Topfen</b>		
Fruchtgemüse	Pythium-, Rhizoctonia-, Fusarium-, Phytophthora-Arten	0,2-0,25 g / Pflanze tropfen; 0,2-0,25 g / Pflanze gießen (max. 10 g / m <sup>2</sup> )
Fruchtgemüse	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Didymella lycopersici</i>	1 g / m <sup>2</sup> spritzen*
Zierpflanzen	<i>Botrytis cinerea</i>	1 g / m <sup>2</sup> spritzen*
Zierpflanzen	Pythium-, Rhizoctonia-, Fusarium-, Phytophthora-Arten	0,2-0,25 g / Pflanze tropfen; 0,2-0,25 g / Pflanze gießen (max. 10 g / m <sup>2</sup> )

\*Der Hersteller empfiehlt PRESTOP® unter Berücksichtigung der maximalen Aufwandmenge 0,5 %ig anzuwenden.

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie Warnhinweise/-symbole und Auflagen.