



**Sehr gute
Verträglichkeit
auch bei Trocken-
und Hitzestress**

Zentero[®] SPR

Sophorolipid-basiertes Netz- und Haftmittel aus nachwachsenden Rohstoffen zur Wirkungsverbesserung von Pflanzenschutz- anwendungen und Blattdüngern

**3 in 1:
verbesserte Regenfestigkeit,
Wirkstoffaufnahme und Anhaftung**

**Umweltschonend in Produktion und
Anwendung: aus 100 % heimischen,
nachwachsenden Rohstoffen**

Für alle Kulturen geeignet

Wirkungsweise

Zentero® SPR ist ein biologisch abbaubares, multifunktionales Tankmischungsadditiv, welches sowohl die Regenfestigkeit (Sticker) als auch die Wirkstoffaufnahme (Penetration) von Pflanzenschutzmitteln und Blattdüngern verbessert. Der angetrocknete Belag kann durch Niederschläge nicht unmittelbar abgewaschen werden und bildet somit vor allem in niederschlagsreichen Perioden ein sicheres Depot. Außerdem steigert Zentero® SPR die Anhaftung der Spritztropfen auf der Blattoberfläche, was zu geringeren Abtropfverlusten führt (Retention).

Bei Wasserstress und unter heißen und trockenen Bedingungen zeichnet sich Zentero® SPR zudem durch seine sehr gute Verträglichkeit aus.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **3 in 1:** verbesserte Regenfestigkeit, Wirkstoffaufnahme und Anhaftung
- Sehr gute Verträglichkeit auch bei Trocken- und Hitzestress
- Umweltschonend in Produktion und Anwendung: aus 100 % heimischen, nachwachsenden Rohstoffen
- Für alle Kulturen geeignet

Anwendungsempfehlungen

FiBL gelistet

Fungizide (Kontakt und Systemisch) 500-1000 ml/ha

Für den konventionellen Anbau:

Herbizide (Vor- und Nachauflauf) 300-600 ml/ha

Wachstumsregulatoren 500 ml/ha

(Empfohlene Anwendungskonzentration: Je 0,2%ig unter Beachtung der max. zugelassenen Aufwandmenge)


Zentero® SPR immer als letzte Komponente der Spritzbrühe begeben.



Für detaillierte Informationen sowie Downloads (z.B. Sicherheitsdatenblatt) scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie den folgenden Link auf:
<https://biofa-profi.de/de/z/zentero-spr.html>

Wirkungsabsicherung von VitiSan® durch Zentero® SPR


Echter Mehltau an Erdbeeren (NL, 2022)



Quelle: Andermatt Niederlande & Botany NV
Leitlinie: GEP- Versuch (Gewächshaus); Behandlungstermine ABCDE: A:15.09, B:22.09, C: 29.09, D: 06.10, E:13.10;
Boniturtermine:15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10 (nur letzter Termin dargestellt)


Verbesserte Kupferwirkung durch Zentero® SPR

Falscher Mehltau an Zwiebeln – Verringerung der Befallsstärke



Wirksamkeitsverbesserung von Kupferfungiziden im Öko-Kartoffelanbau

Gegen Kraut- und Knollenfäule



Beste Wirksamkeit und bestes finanzielles Ergebnis durch den Zusatz von Zentero® SPR!

Zugabe Netzmittel	ohne Zusatz	+ WETCIT® 0,8 l/ha	+ Zentero® SPR 0,6 l/ha	+ Pinienöl 0,3 l/ha	+ stärkerbasiertes Netzmittel 2 l/ha
Finanzieller Mehrertrag		+22%	+32%	+26%	+22%

Erzeugerpreis 50 €/dt Öko-Kartoffeln, 100 % marktfähige Ware (Theorie), 15 €/ha pro Pflanzenschutzanwendung (zzgl. Mittelkosten pro Variante)

Befallsstärke in % ■ 05. August ■ 11. August ■ 18. August

LTZ Augustenberg 2021, Donaueschingen
Leitlinie: GEP Versuch; **Behandlungstermine** T1-T10: 15.6.21/21.06./29.06./06.07./13.07./20.07./27.07./03.08./10.08./18.08.; **Boniturtermine** B1-B4: 31.07./05.08./11.08./18.08 (dargestellt nur B2-B4);
Sorte: Granola

Mit Zentero® SPR 20 % höherer Wirkungsgrad gegen Echter Mehltau!

■ Befallshäufigkeit (%)
■ Befallsstärke (%)
■ Wirkungsgrad (%)